



*Nasiona
na czasie*





TORSEED
Przedsiębiorstwo
Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń; tel. 56 658 48 00
www.torseed.pl, torseed@torseed.pl

Spis treści

Warzywa cebulowe	2 - 4
Warzywa dyniowate	5 - 9
Warzywa kapustne	10 - 11
Warzywa korzeniowe	12 - 15
Warzywa liściowe	16 - 18
Warzywa psiankowate	19 - 23
Warzywa rzepowate	24 - 25
Warzywa strączkowe	26 - 29
Rośliny różne	30
Rośliny zielarskie i przyprawowe	31
Nasza oferta	32 - 33
Dane dotyczące uprawy warzyw	34
Kwiaty jednoroczne niskie	35 - 38
Kwiaty jednoroczne wysokie	39 - 41
Byliny niskie	42 - 44
Byliny wysokie	44 - 46
Rośliny balkonowe i pnące	47 - 49
Rośliny dwuletnie	50
Kwiaty na suche bukiety	51 - 52
Mieszanki kwiatów	53
Produkty marki TORSEED S.A.:	
– Biohumusy, Nawozy	54
– Trawy gazonowe	55
– Róże	56

Sekretariat

sekretariat@torseed.pl tel. 56 658 48 10
fax 56 659 89 31

Dział Obrotu Materiałem Siewnym

Kierownik tel. 56 658 48 56
oms@torseed.pl

Realizacja Zamówień tel. 56 658 48 34
fax 56 652 85 62

Eksport tel. 56 658 48 12
eksport@torseed.pl

Dział Marketingu

Kierownik tel. 56 658 48 56
Dział tel. 56 658 48 12

tel. 56 658 48 69
tel. 56 658 48 70

fax 56 652 85 62
marketing@torseed.pl

Magazyn Nasion Torebkowanych

mt@torseed.pl tel. 56 658 48 60

Dział Zaopatrzenia i Zbytu

Kierownik tel. 56 658 48 54
fax 56 652 85 62

handel@torseed.pl

Dział Rozliczeń Finansowych

Kierownik tel. 56 658 48 41
fk@torseed.pl

Rozliczenia tel. 56 568 48 49

Sprzedaż internetowa

sklep@torseed.pl tel. 56 658 48 30
fax 56 658 48 38



Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nowy katalog oferowanych przez nas produktów. Przedstawiamy w nim gatunki i odmiany warzyw oraz kwiatów do ogródków przydomowych, na działkę i do produkcji towarowej, a także roślin zielarskich i przyprawowych. Osobną grupę w asortymencie stanowią nasiona z przeznaczeniem na kiełki. Oferowane przez nas nasiona zostały wyprodukowane w gospodarstwach specjalistycznych pod nadzorem służb plantacyjnych, z własnych materiałów wyjściowych TORSEED S.A. oraz pochodzących od innych polskich hodowców. Uzupełnieniem oferty są również nasiona z importu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzyliśmy nasz asortyment o produkty marki TORSEED S.A.: BIOHUMUSY i NAWOZY, NASIONA TRAW GAZONOWYCH i KRZEWY RÓŻ, a także innych roślin ozdobnych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również cebulki i kłącza kwiatowe, materiał szkółkarski owocowy i ozdobny, a także środki ochrony roślin oraz akcesoria ogrodnicze.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Służymy fachową radą i profesjonalną obsługą.



Z poważaniem
Prezes Zarządu

dr inż. Zygmunt Cieślik





Torunianka

Odmiana średniowczesna do uprawy z siewu wiosennego. Łuska barwy żółto-brązowej, odporna na pęknięcie. Średnia masa cebul: 150 g. Charakteryzuje się białokremowym mięszem. W typie ogólnoużytkowym, zalecana do bezpośredniego spożycia i mrożenia. Cechą wyróżniającą jest przydatność do bardzo długiego przechowywania oraz bardzo słaba skłonność do wybijania w pędy nasienne. Tolerancyjna na mączniaka rzekomego. Plonuje stabilnie na poziomie 50 t/ha.



Octavia

Średniowczesna oryginalna odmiana przydatna do bezpośredniego spożycia, dla przetwórstwa oraz długiego przechowywania. Wyróżnia się równomiernym załamywaniem szczypioru oraz niezawodnością plonowania. Wyrównana pod względem kształtu i wielkości cebul. Tworzy cebule średniej wielkości (100-130 g), o białym, średnio zwięzłym mięszu. Odmiana polecana również do siewu jesienno (II dekada września).

Odmiana późna, bardzo plenna o dużej trwałości w przechowywaniu. Kształt kulistoromboidalny. Cebule o masie 90-160 g, okryte cienką, słomkowożółtą łuską. Mięsz biały i jędrny o dość ostrym smaku.

Wolska

CEBULOWE



CEBULA

Odmiana	Wczesność	Kształt	Masa [g]	Kolor		Przydatność		
				skórka	miąższ	bezpośred. spożycie	przetwórstwo	przechowywanie
Alibaba	średniopóźna	kulisty	80-100	biała	biały	••	•••	•
Octavia	średniowczesna	kulisty	100-130	żółta	biały	•••	••	•••
Sochaczewska	późna	kulisty	90-160	ciemnosłomkowa	biały	••	••	•••
Torunianka	średniowczesna	kulisty	150	żółto-brązowa	biały	•••	••	•••
Wenta	średniopóźna	kulisto-splaszczony	90-100	czerwona	fioletowo-biały	•••	•	•••
Wolska	późna	kulisto-romb.	90-160	słomkowożółta	biały	••	••	•••

- przydatna
- polecana
- przeznaczona



WARZYWA CEBULOWE

CEBULA
SIEDMIOLATKA



Long White Ishikura

Kroll

POR

SZCZYPIOREK

Wulkan, Jowisz

Blauwgroene Winter
- Arkansas

Bartek

Bulgaarse
Reuzen - Varna

POR

Odmiana	Wczesność	Długość łodygi rzekomej [cm]	Przydatność do zimowania w gruncie	Uwagi
Bartek	późny	ok. 20	+	—
Blauwgroene Winter - typ Arkansas	b. późny	20-25	+	—
Bulgaarse Reuzen - typ Varna	wczesny	60-70	-	typ bułgarski, zbiór letni



WARZYWA DYNIOWATE

DYNIA OLBRZYMA



Bambino



Ambar



Amazonka



Golias



Melonowa Żółta



DYNIA ZWYCZAJNA



Atena Polka F1



Astra Polka, Soraya

WARZYWA

PATISON



Scallopini

Disco, Polo F1

Gagat

CUKINIA

KABACZEK



Nimba



Złoty Cepelin

BEZŁUPINOWA



Miranda

MAKARONOWA WARSZAWSKA

KAWON (ARBUZ)



Crimson Sweet, Bingo

MELON



Melba




Oliwin



DYNIOWATE

OGÓREK



Edyp F₁

Odmiana średniowczesna przeznaczona do uprawy polowej. Charakteryzuje się bardzo wysokim stabilnym plonowaniem oraz bardzo dobrą strukturą plonu, w której duży udział stanowią owoce handlowe. Rośliny tej odmiany cechuje silny wigor oraz występowanie prawie wyłącznie kwiatów żeńskich. Polecana na korniszony, do konserwowania i kwaszenia. Owoce bardzo kształtne, białokolcowe, z lekkim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń oraz przerastania na grubość (bez skłonności do beczułkowatości), bardzo smaczne i chrupkie. W ocenie polowej odmiana ta wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby (parch dyniowatych, mączniak prawdziwy, wirus mozaiki ogórka) oraz wysoką tolerancyjnością wobec mączniaka rzekomego. Polecana do uprawy ekologicznej i integrowanej zarówno dla działkowców, jak i producentów towarowych.

Średniowczesna, bardzo plenna odmiana polecana do produkcji towarowej i amatorskiej. Rośliny o silnym wzroście i prawie wyłącznie żeńskich kwiatach. Owoce bardzo kształtne, o charakterystycznych tępych zakończeniach, bez goryczy. Stosunek długości do szerokości wynosi 2,7:1. W ocenie polowej wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby i wysoką tolerancją wobec mączniaka rzekomego. Odmiana odporna na chłody. Odmiana IWARZ w Skierniewicach, której hodowlę zachowawczą prowadzi TORSEED S.A.

Odys F₁



OGÓREK DO UPRAWY POLOWEJ

WARZYWA

OGÓREK

Odmiana	Użytkowanie	Tolerancja wobec mączniaka	Uprawa	Uwagi
Aladyn F1	Ko	T	P	—
Anulka F1	Kn	T	P	—
Cezar F1	Ko, Kw	T	P	—
Dalila F1	Ko, Kw	T	P	odmiana czarnokolcowa
Dar	S, Ko, Kw	T	P	—
Delicius	S, Mr	brak	P	—
Edyp F1	 Ko, Kw	TT	P	—
Fason F1	Ko, Kw	T	P, F	owoc drobnobrodawkowy
Gracius Gładki F1	S, Mr	T	P, F	owoc gładki, odmiana partenokarpiczna
Hela F1	Ko, Kw	brak	P	—
Julian F1	Ko, Kw	T	P	—
Krak F1	Ko, Kw	T	P	—
Monika	S, Kw*	brak	P, F	—
Odys F1	 Ko, Kw	TT	P	—
Polan F1	Ko, Kw	brak	P	odmiana czarnokolcowa
Polonez F1	Ko, Kw	T	P, F	owoc drobnobrodawkowy
Racibor F1	Ko, Kw	brak	P	—
Rodos F1	Kn, Ko	TT	P	—
Śremski F1	Ko, Kw	brak	P	—
Tessa F1	S	T	P, F	—
Vert Petit de Paris	Kn	brak	P	odmiana czarnokolcowa
Victoria F1	Ko, Kw	brak	P, F	owoc drobnobrodawkowy

* małosolne
T wysoka
TT bardzo wysoka
Ko konserwowy
Kw kwaszeniak
Kn korniszon
Mr mrożonki
S sałatki
F uprawa pod folią
P uprawa w polu

Victoria F1

Cezar F1

Gracius Gładki F1

Aladyn F1

Polan F1

Hela F1

Anulka F1

DYNIOWATE

OGÓREK DO UPRAWY POD OSŁONAMI



OGÓREK

Odmiana	Owoc		Typ wzrostu	Uprawa
	długość [cm]	powierzchnia		
Atos F1	ok. 28	lekko żebr.	normalny	S, TO - wczesna wiosna
Dukat F1	34-36	lekko żebr.	silny	S, TN - wiosna, jesień
Iwa	18-21	gładka	silny	S, TO, TN - wiosna
Monika	11-12	lekko żebr.	normalny	TN - wiosna
Promyk F1	36-40	lekko żebr.	normalny	S - wiosna, jesień
Topaz F1	40-45	żebr.	silny	S - wczesna wiosna

S szklarnia
TO tunel ogrzewany
TN tunel nieogrzewany



KAPUSTA GŁOWIASTA

WARZYWA



Kamienna Głowa



Kapusta włoska



Kalibos



Ditmarska Najwcześniejsza



Haco, Topas,
Langedijker Bewaar 2

KAPUSTA

Odmiana	Grupa wczesności	Ilość dni od posadzenia do zbioru	Głowa				Przydatność			Uwagi
			kształt	kolor	masa [kg]	twardość	bezpośred. spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
biała										
Amager Kurzstrunking	★★★★★	135-140	kulisty	szaroziel.	2,5-3,5	duża	••	•••	•••	główka nisko osadzona
Amager Polana	★★★★★	135-140	kulisty	szaroziel.	3-4	duża	••	•••	•••	—
Ditmarska Najwcześniejsza	★	50-55	kulisty	jasnoziel.	1-1,5	średnia	•••	—	—	do uprawy pod folią agrowłók. i w polu
Kamienna Głowa	★★★★★	140-160	kulisty	szaroziel.	3,5-4	b. duża	•••	•••	••	najkorz. w kwasz. stos. cukrów do kwas.
Langedijker Hort	★★★★★	150-160	kulisty	zielony	3-4	b. duża	•••	••	•••	—
Pierwszy Zbiór	★★	60-70	kulisty	zielony	1,4-2,0	średnia	•••	—	—	—
Sława z Gołębiewa	★★★	75-85	kulisty	jasnoziel.	2-3	duża	••	•••	—	do wczes. kwasz.
czerwona										
Haco	★★	100-110	kulistowydł.	fiol.-ziel.-srebr.	1-1,5	duża	•••	•	—	—
Kalibos	★★★★	105-120	stoż.	purpur.-fiolet.	1,5-2	średnia	•••	•	—	—
Langedijker Bewaar 2	★★★★★	180-187	kulistowydł.	c. czerw.-fiolet	2-2,5	b. duża	••	•	•••	—
Langedijker Polana	★★★★★	150-160	kulistowydł.	c. czerw.-fiolet	2-2,5	b. duża	••	•	•••	—
Topas	★★★★	110-120	kulisty	c. czerw.-fiolet	1-1,5	duża	•••	••	•	—
włoska										
Aubervilliers	★★★	70-75	kulisty	zielony	1,5-2	średnia	•••	—	—	—

★ bardzo wczesna ★★ wczesna ★★★ średniowczesna ★★★★ średniopóźna ★★★★★ późna
• przydatna •• polecana ••• przeznaczona

KAPUSTNE

KAPUSTA BRUKSELSKA



Groninger,
Casiopea

JARMUŻ



Scarlet

BROKUL



Sebastian, Cezar,
Groene Calabrese



Kapral

KALAREPA



Delikates Blauer



Delikates Biała,
Wiedeńska Biała, Titan

KAPUSTA PEKIŃSKA



Hilton, Bristol

KALAFIOR



Rober



Pionier

BURAK ĆWIKŁOWY

WARZYWA

Czerwona Kula 2

Odmiana o kulistych, dobrze wykształconych korzeniach. Miąższ wiśniowoczerwony o słabo zarysowujących się pierścieniach, soczysty i bardzo smaczny. Nadaje się do użytkowania letniego, jesiennego oraz do przechowywania zimowego. Odmiana bardzo plenna – ponad 70 t/ha.

Odmiana późna o cylindrycznych korzeniach. Miąższ ciemnoczerwony, delikatny, smaczny, pierścienie słabo zarysowane lub niewidoczne. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przetwórstwa (doskonała do konserwowania). Odmiana plenna.

Opolski

BURAK LIŚCIOWY

Odmiana wczesna o płaskich korzeniach. Miąższ ciemnoczerwony o lekko zaznaczonych pierścieniach, bardzo smaczny i słodki. Nadaje się do uprawy pęczkowej oraz do przechowywania.

Egipski

Rhubarb Chard

KORZENIOWE



MARCHEW JADALNA

Odmiana bardzo wczesna, przydatna do zbioru pięczkowego, nadaje się do uprawy towarowej w polu oraz amatorskiej pod osłonami. Dzięki małej naci może być uprawiana w inspektach. Charakteryzuje się korzeniem tępo zakończonym, miąższ ciemnopomarańczowy, kruchy i smaczny.

Amsterdam 3 - Amsterdamska TOR

Odmiana późna, bardzo plenna – powyżej 30 t/ha. Przydatna do przechowywania oraz przetwórstwa. Korzeń lekko stożkowaty, o tępej nasadzie. Walec osiowy średni, barwą podobny do kory (pomarańczowy). Miąższ soczysty, bardzo smaczny. Uzyskuje lepszą plenność w uprawie na redlinach.

Berlikumer 2 - Perfekcja TOR



MARCHEW JADALNA

WARZYWA



Regulska



Sukces



Nantejska Polana

MARCHEW

Odmiana	Wczesność okres wegetacji [dni]	Korzeń		Przydatność			Uwagi
		długość [cm]	kształt	świeży rynek	przetwórstwo	przechowywanie	
Amsterdam 3 - Amsterdamska TOR	wczesna [100]	ok. 15	walcowaty	★★★	★★	—	również pod osłoną
Berlikumer 2 - Perfekcja TOR	późna [150]	16-19	walcowaty, stożek zaokrąglony	★★★	★★	★★★	—
Chantenay	wczesna [100]	11-12	gruby stożek	★★★	★★★	—	—
Dolanka	późna [160]	17-24	lekki stożek	★★★	★★★	★★	—
Flakkese 2 - Flacoro POL	późna [130-160]	17-22	walcowaty, lekko zaokrąglony	★★★	★★★	★★★	nie kumuluje azotanów
Kalina F1	wczesna [100]	17-20	walcowaty, lekko zaokrąglony	★★★	★★★	—	również pod osłoną
Kamila F1	wczesna [100]	20-22	lekki stożek	★★★	★★	—	również pod osłoną
Katrin - typ Chantenay	śr.wczesna [110-115]	11-12	gruby stożek	★★★	★★★	—	—
Koral	późna [140-150]	18-20	walcowaty stożek	★★★	★★	★★★	możliwy siew ozimy, nie kumuluje azotanów
Lenka	śr.późna [100]	13-15	lekki stożek	★★★	★★	★★	—
Nantejska Polana	śr.wczesna [115-120]	15-18	walcowaty	★★★	—	—	—
Pierwszy Zbiór	wczesna [110]	11-12	lekki stożek	★★★	★★	—	—
Regulska	późna [140]	12-19	walcowaty stożek	★★★	★★★	★★★	—
Sukces	późna [150]	22-26	lekki stożek	★★★	★★	★★	—

Chantenay

★★ dobra ★★★ bardzo dobra



KORZENIOWE

PIETRUSZKA KORZENIOWA



PIETRUSZKA

Odmiana	Wczesność	Długość korzenia [cm]	Przydatność			Uwagi
			świeży rynek	przetwórstwo	zimowanie w polu	
Alba	śr.późna	18-22	•••	•••	••	wskazana uprawa na redlinach
Cukrowa	wczesna	15-17	•••	•	—	—
Konika	późna	12-15	•••	•••	•••	na gleby ciężkie
Lenka	śr.późna	16-18	•••	•••	•	—
Halblange - Berlińska TOR 	późna	18-20	•••	•••	•••	wskazana uprawa na redlinach
Vistula	śr.późna	19-22	•••	••	•••	wskazana uprawa na redlinach

• przydatna •• polecana ••• przeznaczona

Halblange - Berlińska TOR

Odmiana późna, bardzo plenna (powyżej 30 t/ha). Korzeń kształtu wydłużonego stożka, długości ok. 20 cm. Kora biała, wałec osiowy kremowobiały, miąższ jędrny i smaczny. Przeciętna waga 200 g. Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia, bardzo dobrze znosi przechowywanie, polecana również do przetwórstwa. Może zimować w polu.

SELER KORZENIOWY



Makar, Denar, Zagłoba, Edward, Talar

PASTERNAK



Półdługi Biały

BRUKIEW



SKORZONERA



SALATA GŁOWIASTA

WARZYWA

MASŁOWA

Odmiana masłowa. Polecana do wczesnej uprawy polowej. Wytwarza zwięzłe główki o średniej wielkości (około 250 g), charakterystycznie żółto-zielono wybarwione. Termin osiągnięcia dojrzałości konsumpcyjnej – wczesny. Wykazuje znaczną odporność na choroby.

Królowa Majowych

Odmiana masłowa, średniopóźna, polecana do wczesnej uprawy w polu. Wytwarza główki średnio zwarte, dość duże (około 350 g), jasnozielone o wysokich walorach smakowych. Chętnie wybierana przez kupujących ze względu na odpowiednią konsystencję liści.

Michalina

KRUCHA (LODOWA)

Salata głowiasta, krucha o dużych, średnio zwartych zamkniętych główkach, kształtu poprzecznie eliptycznego. Barwa zielona do jasnozielonej. Liście średniej pęcherzykowości. Struktura plonu należyta: jednoczesność tworzenia główek i mała skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Odmiana o wyjątkowym smaku i konsystencji liści. Przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi oraz wczesnej uprawy w polu.

Kumak

LIŚCIOWE

SALATA

głowiasta masłowa

głowiasta krucha ("lodowa")

SALATA

Odmiana	Miejsce uprawy	Uprawa na zbiór					masa [g]	Główka		Uwagi
		wczenowiosenny	wiosenny	letni	jesienny	zimowy		kolor	zwięzłość	
głowiasta masłowa										
Anielka	S, T	★	★	—	★★★★	★★	250	jasnozielony	średnia	—
Atena	S, T	★	★	—	★★★★	★★	280	ciemnozielony	duża	—
Bona	P, T	★★★★	★★	★★	★★	—	350	żółto-zielony	duża	—
Cud Voorburgu	P	—	★★	★★	—	—	300	jasnozielony	duża	—
Dippego	P	—	★	★★	★★	—	250	zielony	duża	—
Edyta Ożarowska	P, T	★★	★★	—	—	—	500	zielony	duża	—
Ewelina	P	—	★★	★★	★★	—	400-500	zielony	średnia	—
Justyna	P, T	★★	★★★★	★★	★★	—	350	jasnozielony	średnia	—
Królowa Majowych	P	★★	★★	—	—	—	250	żółto-zielony	duża	—
Michalina	P	—	★★	★★	—	—	350	jasnozielony	średnia	—
Nochowska	P	—	★★	★★	★★	—	250	jasnozielony	duża	—
Syrena	T, P	★★	★★★★	—	—	—	400	żółto-zielony	mała	—
Zina	P	★★	—	—	—	—	250	jasnozielony	średnia	wysiew jesienny k. VIII - k. IX
głowiasta krucha („lodowa”)										
Arka	P	—	★★	★★	★★	—	1000	zielony	duża	—
Carmina	T, P	★★	★★	★★	★★	—	>1000	zielono-karminowy	duża	—
Grenada Ożarowska	P	—	★★	★★	★★	—	1000	zielony	duża	—
Królowa Lata	P	—	★★	★★	★★	—	1000	żółto-zielony	duża	—
Kumak	T, P	★★★★	★★	—	—	—	1000	jasnozielony-zielony	średnia	—
Samba	P	—	★★	—	—	—	700	jasnozielony	duża	—
liściowa										
Dubacek	P	—	★★	★	★★	—	—	zielony	—	typ „dębolistny”
Limona Hortag	P	—	★★	★	★★	—	—	żółto-zielony	—	typ Lollo Bionda
Lollo Bionda	T, P	★★★★	★★	★★	★★	—	—	zielony	—	rozeta
Lollo Rossa	T, P	★★★★	★★	★★	★★	—	—	wiśniowoczerw.	—	rozeta
Rosela	P	—	★★	★	★★	—	—	czerwony	—	rozeta
rzymska										
Liwia	P	★★	★★	★	—	—	900	zielony	mała	—
Tiara	P	★★	★★	★	—	—	900	zielony	mała	—

liściowa typ Lollo

rzymska

typ dębolistny

S szklarnia T tunel foliowy P pole
 ★ przydatna ★★ polecana ★★★ przeznaczona



WARZYWA LIŚCIOWE

KOPER OGRODOWY



Ambrozja

Odmiana o dużej zawartości olejków eterycznych, a także o intensywnym ciemnozielonym wybarwieniu. Dzięki dużej liczbie bocznych rozgałęzień daje wysoki plon masy zielonej. Odmiana przydatna zarówno do zbioru „na zielono”, jak również do suszenia i mrożenia.

CYKORIA



Di Bruxelles



Palla Rossa, typ Radicchio

SZCZAW



Lyoński, Belwiski

RABARBAR



SZPINAK



Matador, Olbrzym Zimowy

Nowozelandzki

SELER NACIOWY



Zefir

PIETRUSZKA NACIOWA



Festival 68

Astra, Moss Curled 2

RZEŻUCHA




WARZYWA PSIANKOWATE

POMIDOR WYSOKI

Odmiana do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu. Wymaga prowadzenia przy palikach. Owoce bardzo duże (około 500 g), mięsiste o barwie malinowej i sercowatym kształcie. Z uwagi na wyjątkowy smak, przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.



Bawole Serce



Jantar


Odmiana wczesna, wielkoowocowa, do uprawy w tunelu foliowym przy podporach. Owoc barwy żółto-pomarańczowej, bardzo duży (450-600 g), lekko spłaszczony, średnio twardy, bardzo mięsisty o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Odmiana amatorska, przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia. Możliwa jest również uprawa w polu przy palikach.



Odmiana silnie rosnąca, średniowczesna do uprawy w nieogrzewanych tunelach. Owoce żółte, gładkie, średniej wielkości (80 – 100g) o wyjątkowym i niepowtarzalnym smaku. Można zbierać owoce całymi gronami. Możliwa jest również uprawa w polu przy palikach.



Helio



Cytrynek Groniasty

POMIDOR KOKTAJLOWY

Odmiana drobnoowocowa, wczesna w ciągłym typie wzrostu, przeznaczona do uprawy w nieogrzewanych tunelach, w polu przy palikach oraz na balkonie. Grona nierozgałęzione długości 60-70 cm. W gronie do 65 szt. bardzo smacznych, żółto-cytrynowych owoców o średniej masie 15g.

Odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe, polecana do uprawy ekologicznej.



Malinowy Smaczek

Stosunkowo wczesna odmiana drobnoowocowa, do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi lub w polu w miejscach osłoniętych. Wymaga cięcia i prowadzenia na podporach. Owoce malinowe typu „cherry” (średnia masa 7-10 g), wyjątkowo trwałe, zebrane w złożone grona. Z jednej rośliny możemy uzyskać 150-200 szt. wydłużonych, orzechowatych owoców o wyjątkowo małej skłonności do pęknięcia i pełnym pomidorowym smaku. *Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Polecana do uprawy ekologicznej.*





Malinowy Kapturek

Odmiana drobnoowocowa, samokończąca. Owoc mały (7 - 8 g), cylindryczny, o wyjątkowym smaku, barwy różowo-malinowej, trwały, bez skłonności do opadania. Grona długości około 45-75 cm, najczęściej złożone. Liczba owoców na roślinie ok. 450-600. Z uwagi na ciężar owoców, rośliny dobrze reagują na podwiązanie gron. Odmiana do uprawy w tunelu foliowym przy podporach oraz w polu w miejscach osłoniętych. Nadaje się do uprawy ekologicznej.

Cechy wyróżniające: odmiana pomidora typ „cherry” o malinowych owocach, bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.

POMIDOR

Odmiana	Miejsce uprawy	Wczesność	Owoc			Uwagi
			kształt	masa [g]	kolor	
Bawole Serce 	T, P	śr.wczesny	sercowaty	500	malinowy	bezpośrednie spożycie
Bekas F1	S, T	śr.wczesny	kulisto spłaszczony	70-125	czerwony	prowadzić na 8-9 gron
Cytrynek Groniasty 	T, P, B	wczesny	kulisto wydłużony	15-18	żółty	owoce koktajlowe, w gronie 65 szt. owoców
Helio 	T	śr.wczesny	kulisty	80-90	żółty	możliwy zbiór w gronach, owoc bez skł. do pękania
Jantar 	T, P	śr.wczesny	kulisto spłaszczony	300-450	pom.burszt.	owoc bardzo mięsisty, bardzo smaczny
Krakus	P, T	śr.późny	kulisty	80-90	ciemno czerwony	—
Malinowy Kapturek 	T, P, B	bardzo wczesny	wydłużony	7-9	róż.malin.	owoce koktajlowe, 450-600 owoców na roślinie, odp. na chor. grzybowe
Malinowy Retro	P, T	wczesny	kulisty	150-180	malinowy	—
Malinowy Smaczek 	T, P, B	wczesny	wydłużony	7-10	malinowy	owoce koktajlowe, odp. na chor. grzybowe i bakteryjne
Pelikan F1	S, T, P	wczesny	kulisto spłaszczony	80-120	czerwony	—
Perkoz F1	S, T	wczesny	kulisto spłaszczony	70-110	czerwony	prowadzić na 9-10 gron
Remiz F1	S, T, P	śr.późny	kulisto spłaszczony	80-100	czerwony	—
Słonka F1	S, T, P	śr.późny	kulisty	125	czerwony	—
Tukan F1	S, T	wczesny	kulisto spłaszczony	75-130	czerwony	—

B balkon

P pole

S szklarnia

T tunel nieogrzewany



PSIANKOWATE

POMIDOR GRUNTOWY KARŁOWY

Odmiana wielkoowocowa, z przeznaczeniem na świeży rynek. Roślina samokończąca. Owoc malinowy, bez piętki, duży i bardzo duży (500-650 g), średnio twardy, słabe żebrowanie przy szypułce. Wyjątkowo smaczny. Odmiana do uprawy w polu bez podpór lub pod niską folią. **Cecha wyróżniająca: owoc w typie Bawole Serce na niskiej roślinie.**



Malinowy Rodeo



Zyska

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu, doskonała do przetwórstwa, samokończąca, przeznaczona także do bezpośredniego spożycia. Owoc wydłużony, średniej wielkości, mięsisty, twardy o intensywnej barwie miąższu oraz wysokiej zawartości suchej masy. W transporcie odporny na uszkodzenia i pęknięcie. **Uniwersalne przeznaczenie owoców.**

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu oraz pod niskie osłony, doskonała dla przetwórstwa. Rośliny samokończące, nie wymagają cięcia i palikowania. Owoc kulisty, malinowy, o wyjątkowo intensywnej barwie miąższu. Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Wierne plonowanie – 40-60 t/ha. Ze względu na wyjątkowy smak przeznaczona do bezpośredniego spożycia, jak również do produkcji soków w przetwórstwie. **Odmiana polecana do uprawy ekologicznej.**






Malinowy Kujawski

POMIDOR

WARZYWA



POMIDOR

Odmiana	Typ wzrostu roślin	Wczesność	Owoc			Przydatność	Uwagi
			kształt	masa [g]	kolor		
Betalux	sztywno-łodygowy	b. wczesna	kulisty, lekko spłaszcz.	70-80	czerwony	przetwórstwo, bezp. spożycie	—
Jawor	sztywno-łodygowy	wczesna	kulisto-gładki	70-100	czerwony	produkcja wielkotowarowa	—
Koralik	wiotko-łodygowy	średnio-wczesna	kulisty	średnica 2-3 [cm]	czerwony	odmiana amatorska	owoce typu „cherry”
Malinowy Kujawski	 sztywno-łodygowy	średnio-wczesna	kulisty	70-90	malinowy	przetwórstwo, bezp. spożycie	toler. na choroby grzybowe i bakteryjne
Malinowy Rodeo	 wiotko-łodygowy	średnio-wczesna	sercowaty	500-650	malinowy	bezp. spożycie	owoc w typie „Bawole Serce”, bez piętki
Poranek	wiotko-łodygowy	średnio-wczesna	kulisty	70-100	czerwony	przetwórstwo, bezp. spożycie	toler. na przymrozki do -1°C
Zyska	 wiotko-łodygowy	średnio-wczesna	cyldryczny	60-80	czerwony	przetwórstwo, bezp. spożycie	owoc twardy, wys. zaw. suchej masy

PSIANKOWATE

PAPRYKA



PAPRYKA

Odmiana	Miejsce uprawy				Wczesność	Owoc				Uwagi
	SO	TO	S, TN	P		masa [g]	grubość ścianki [mm]	kolor	kształt	
słodka										
Aleksander	—	—	★★	★★	—	80-90	8-10	ciemnoczerw.	typ pomidorowy	—
California Wonder	—	—	★★	★★	śr.wczesna	160-190	6-7	ciemnoczerw.	typ „block”	—
Ingrid	★★	★★	★★	—	śr.wczesna	200	8-10	fiolet.-brąz.	typ „block”	—
Luba	—	—	★★	—	wczesna	>150	7-8	ciemnoczerw.	graniastostłup	—
Mino	—	—	★★	★★	bardzo wczesna	>200	8-10	ciemnoczerw.	typ „block”	sadz. w dużym zagęszczeniu, odm. karłowa, wcześnie plonująca
Oleńka	—	—	★★	★	wczesna	90	7-9	ciemnoczerw.	typ pomidorowy	—
Ożarowska	—	—	★★	★	śr.wczesna	120	7-8	ciemnoczerw.	typ „block”	odporna na stresowe warunki uprawy
Sono	—	★	★★	—	śr.wczesna	120-130	7-8	żółty	typ „block”	wysoki poziom cukru
Stanola F1	—	★★	★★	—	wczesna	120-130	5-6	ciemnoczerw.	wydłużony, zwiężający się	odm. bardzo plenna, ok. 10 kg/m ²
Trapez	—	—	★★	★	wczesna	115	8-10	ciemnoczerw.	trapez na przekroju	odporna na stresowe warunki uprawy
półostra										
Rokita	—	—	—	★★	wczesna	25-45	3-4	ciemnoczerw.	stożkowy	—
ostra										
De Cayenne	—	—	—	★★	śr.wczesna	25-30	2-3	czerwony	stożkowy	—

★ możliwa ★★ wskazana



RZODKIEWKA



Krasa

Opolanka

WARZYWA

Odmiana wczesna, polecana do uprawy pod osłonami i w polu. Zgrubienia kuliste, jednobarwne, karminowo-czerwone średnicy 2,5-3 cm, o bardzo słabej skłonności do parcenia. Wyróżnia się wyrównanym kształtem. Mięsz smaczny i łagodny.

Odmiana wczesna, o zgrubieniu cylindrycznym długości 4-5 cm i średniej wadze 8-9 g. Polecana do uprawy pod osłonami i w polu w cyklu wiosennym i jesiennym. Odznacza się smacznym mięszem, o małej skłonności do parcenia. Skórka o barwie szkarłatnej z białą plamą, cienka i ładnie wybarwiona. Odmiana pełna. W optymalnych warunkach uprawowych okres od siewu do zbioru wynosi około 27 dni.

RZODKIEW



Runder Schwarzer Winter,
Murzynka

Agata

RZEPA



Golden Ball

RZEPOWATE



Carmen

Złota

Jutrzenka

RZODKIEWKA



Warta



Alba

Odmiana	Zgrubienie		Uprawa	
	kształt	kolor skórki	w polu	pod osłonami
Alba	kulisty	biały	wiosna, jesień	—
Carmen	kulisty	karmin.czerw.	wiosna, p. jesień	—
Cherry Belle	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Fiesta	kulisty	karmin.czerw.	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Jutrzenka	owalno-wydłużony	róż.-czerw.	od wiosny do jesieni	wiosna, jesień
Krakowianka	kulisty	czerw.-biały	wiosna	wiosna
Krasa	kulisto-splaszczony	karmin.czerw.	wiosna	wiosna
Mila	cylicydryczny	czerw.-biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Opolanka	cylicydryczny	szkarł.-biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Ria	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	—
Rowa	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, zima
Saxa Polana	kulisty	czerwony	wiosna	wiosna, jesień
Silesia	cylicydryczny	czerw.-biały	wiosna	p. jesień, w. wiosna
Sopel Lodu	cylicydrycznie wydłużony	biały	wiosna, jesień	—
Szkarłatna z Białym Końcem	kulisto-splaszczony	szkarł.-biały	wiosna, p. jesień	—
Tetra Hłowiecka	kulisto-splaszczony	szkarł.-biały	wiosna, jesień	—
Warta	cylicydryczny	szkarł.-biały	wiosna	p. jesień, w. wiosna
Złata	kulisty lekko wydłuż.	żółty	wiosna, jesień	—

Tetra Hłowiecka

Saxa Polana, Rowa

Sopel Lodu



FASOLA SZPARAGOWA



Jagusia

Odmiana średniowczesna, amatorska, szparagowa, zielonostrąkowa z możliwością użytkowania na suche nasiona. Roślina wysoka (około 50 cm) o wyjątkowo sztywnych, mocnych pędach. Odporna na wyleganie. Wysokie osadzenie strąków uniemożliwia kontakt z podłożem, korzystnie wpływając na ich zdrowotność. Odmiana wysoce tolerancyjna na chłody podczas wschodów oraz choroby grzybowe. Strąki długości 12-14 cm, bezwłókniste, wyjątkowo smaczne, bez tendencji do przejrzenia. Nasiona barwy ciemnobordowej o delikatnym, niepowtarzalnym smaku. Plonuje wiernie niezależnie od warunków wegetacji.

Bardzo wczesna odmiana szparagowa żółtostrąkowa. Ze względu na stopniowe dojrzewanie, polecana jest do uprawy w ogrodach przydomowych. Strąki długości 11 – 12 cm, żółte, proste, bezwłókniste. Smaczna, nadaje się do bezpośredniego spożycia, jak również do przetwórstwa (mrożonki, konserwy). Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach nieogrzewanych i pod agrowłókniną.

Złota Saxa



**Borlotto
Lingua di Fuoco**



STRĄCZKOWE

FASOLA TYCZNA

FASOLA								
Odmiana	Strąk			Wczesność (długość okresu wegetacji)	Przydatność			Uwagi
	kolor	długość [cm]	szerokość [cm]		bezpośred. spżycie	konserw.	mrożenie	
szparagowa karłowa								
Jagusia 	ciemnozielony	12-14	0,8-1	70	••	••	••	polecana również na suche nasiona, nasiona bordowo-fioletowe
Esterka	zielony	13-15	0,8-0,9	70	••	•	••	—
Jawa	zielony	11-13	0,9	75	••	••	••	—
Majorka	zielony	15-16	0,8-0,9	80	••	••	••	—
Goldpantera	żółty	12-15	0,8-0,9	65	••	•	•	—
Korona	żółty	9-10	0,8-0,9	63	••	•	•	polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach
Laurina	żółty	11-13	0,8	72	••	•	•	—
Wstęga	żółty	12-13	1,8-2,1	80	••	—	—	typ „mamut”
Złota Saxa 	żółty	11-12	0,8-0,9	60	••	•	•	polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach
Purple King	fioletowy	12-13	0,8-0,9	wczesna	••	••	••	po ugotowaniu kolor zielony
szparagowa tyczna								
Blauhilde	fioletowy	20-25	1,2-1,5	65-70	••	—	—	po ugotowaniu kolor zielony
Gazela	żółty	22	1,8-2,2	wczesna	••	—	—	—
Goldmarie	żółty	20-25	2-2,5	60-65	••	—	•	typ „mamut”
Hilds Neckarkönigin	zielony	20-25	1,5-1,8	60-65	••	—	•	—

• dobra •• bardzo dobra



WIELOKWIATOWA



Piękny Jaś

Późna odmiana fasoli wielokwiatowej przeznaczona na suche nasiona. Rośliny wysokości 250 – 350 cm. Nasiona białe, błyszczące. Polecana do bezpośredniego spożycia, dobrze znosi konserwowanie.



Kontra, Felicja, Eureka

GROCH SIEWNY

WARZYWA



TORSEED®

Cud Kelvedonu

Odmiana wczesna (od siewu do pierwszego zbioru 80 dni), łuskowa o nasionach pomarszczonych, jednocześnie dojrzewająca. Nasiona duże, kuliste, pełne, po 6-7 sztuk w strąku. Nasiona świeże jak również konserwowe o wysokich walorach smakowych. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz dla przetwórstwa.



TORSEED®

Sześciotygodniowy

Odmiana bardzo wczesna (od siewu do pierwszego zbioru 60 – 70 dni). Nasiona gładkie, równomiernie dojrzewające. Strąki jasnozielone, do 9 cm długości. Nasiona świeże średniej wielkości, jasnozielone. Nasiona suche kuliste, jasnozielone. Odmiana polecana do amatorskiej uprawy.



STRACZKOWE

GROCH SIEWNY



cukrowy



łuskowy

GROCH

Odmiana	Wczesność (długość okresu wegetacji)	Wysokość roślin [cm]	Masa tysiąca nasion [g]	Uwagi
cukrowy				
Łówiecki	średniowczesny (85)	45-55	—	bez wyściółki pergaminiowej
łuskowy				
Cud Kelvedonu	 wczesny (78-80)	45-60	450	nasiona pomarszczone
Izolda	średniopóźny (80-84)	70-90	380	nasiona pomarszczone
Pegaz	średniowczesny (78-82)	45-60	440	nasiona pomarszczone
Sześciotygodniowy	 bardzo wczesny (60-65)	90-100	360	nasiona gładkie
Telefon	późny (85-100)	150-250	660	wymaga podpór


FASOLNIK CHIŃSKI



BÓB



Karmazyn



Windsor Biały,
Hangdown Biały



ROŚLINY RÓŻNE

**KUKURYDZA
PĘKAJĄCA**



OBERŻYNA



SŁONECZNIK



**KUKURYDZA
CUKROWA**



POZIOMKA



SZPARAG



ROŚLINY ZIELARSKIE I PRZYPRAWOWE



- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1 | Melisa lekarska | (<i>Melissa officinalis</i>) |
| 2 | Cząber ogrodowy | (<i>Satureja hortensis</i>) |
| 3 | Rumianek pospolity | (<i>Matricaria chamomilla</i>) |
| 4 | Malwa czarna | (<i>Althea rosea</i> var. <i>nigra</i>) |
| 5 | Majeranek ogrodowy | (<i>Origanum majorana</i>) |
| 6 | Koper włoski Fenkuł | (<i>Foeniculum capillaceum</i> var. <i>azoricum</i>) |
| 7 | Koper włoski | (<i>Foeniculum vulgare</i>) |
| 8 | Dziurawiec zwyczajny | (<i>Hipericum perforatum</i>) |
| 9 | Kozłek lekarski | (<i>Valeriana officinalis</i>) |
| 10 | Mięta pieprzowa | (<i>Mentha piperita</i>) |
| 11 | Hyzop lekarski | (<i>Hyssopus officinalis</i>) |
| 12 | Ogórecznik lekarski | (<i>Borago officinalis</i>) |
| 13 | Kolendra siewna | (<i>Coriandrum sativum</i>) |
| 14 | Bazylija pospolita | (<i>Ocimum basilicum</i>) |
| 15 | Rozmarn lekarski | (<i>Rosmarinus officinalis</i>) |
| 16 | Szałwia lekarska | (<i>Salvia officinalis</i>) |
| 17 | Lebiodka pospolita | (<i>Origanum vulgare</i>) |
| 18 | Kozieradka pospolita | (<i>Trigonella foenum graecum</i>) |
| 19 | Ruta zwyczajna | (<i>Ruta graveolens</i>) |
| 20 | Lubczyk lekarski | (<i>Levisticum officinalis</i>) |

20

31

PROGRAM PODSTAWOWY

NASZA



NA TAŚMIE



NANO-GRO



Linia nasion na ulegającej biodegradacji taśmie wodorozpuszczalnej. Taśma nasienna ułatwia ręczny wysiew i eliminuje pracochłonne przerywanie roślin oraz zabezpiecza prawidłowe odległości między nimi. Ze względu na jednakową głębokość siewu, umożliwia wschody roślin w jednakowym czasie. Zarówno nasiona jak i siewki, w początkowym okresie rozwoju zabezpieczone są przed chorobami grzybowymi.

Linia nasion zaprawianych naturalnym biostymulatorem wzrostu Nano - Gro, który uruchamia mechanizmy obrony roślin przed chorobami. Powoduje wzrost energii kiełkowania nasion, a także zwiększa wigor i żywotność roślin poprzez lepszą absorpcję składników pokarmowych. Wzmacnia system korzeniowy, powoduje wzrost wielkości plonu oraz jakości konsumpcyjnej warzyw.

OTOCZKOWANE



INKRUSTOWANE



WARZYWA

DANE DOTYCZĄCE UPRAWY WARZYW

Gatunek	Produkcja z rozsady	Wysiew wprost do gruntu	Orient. ilość nasion w 1 g	Pora wysiewu rozsada/grunt	Liczba dni od wysiewu do wschodów	Zapotr. nasion g/ar rozsada/grunt	Pora sadzenia do gruntu
Bób	—	●	1-2	III-IV	8-14	3000-4000	—
Brokuł włoski	●	—	330-400	III, IV, V	6-10	3-5	IV, V, VI
Brukiew	●	●	300-450	k.IV, V/ k.IV-p.V	6-10	6/30	k.IV-½VIII
Burak ćwikłowy	—	●	50-80 kłęb. 75-150 nas.	10.IV-30.VI	10-14	120-200	—
Burak liściowy	—	●	50-80 kłęb. 75-150 nas.	½IV-VI	10-14	120-200	—
Cebula	—	●	250-300	III-IV	7-12	40-60	—
Cebula siedmiolatka	●	●	300-450	IV	7-12	30/30-40	V/VI
Cykoria liściowa	—	●	600-800	½V-½VI	14-21	30-60	—
Dynia olbrzymia	—	●	2-4	½V	6-10	20-30	—
Dynia zwyczajna	—	●	6-12	½V	6-10	30-40	—
Fasola n/s ziarno karłowa	—	●	2-6	½V	6-10	700-2000	—
Fasola n/s ziarno tyczna	—	●	1-2	10-15.V	6-10	600-900	—
Fasola szp. karłowa	—	●	2-6	10.V-½VII	6-10	600-800	—
Fasola szp. tyczna	—	●	2-6	½V	6-10	600-900	—
Groch	—	●	2-10	III-½IV	6-12	1500-3000	—
Jarmuż	●	●	300-400	V-VI/ ½VII-½VIII	6-10	6/20-30	VII-VIII
Kalańior późny	●	—	330-400	k.V-½VI	6-10	10	VII
Kalańior wczesny	●	—	330-400	III-½IV	6-10	5-6	V
Kalarepa	●	—	350-400	IV-V	5-10	10	V-VII
Kapusta brukselska	●	—	350-400	½IV-p.V	6-10	5-6	½VI-p.VII
Kapusta gł. wcz. i śr. wcz.	●	—	250-300	k.II-III/k.IV-V	6-10	6-8	½IV-½V
Kapusta gł. późna	●	●	250-300	IV-V/½V-½VI	6-10	6/15	k.V-½VI
Kapusta pekińska	—	●	350-400	20-31.VII	5-10	30-40	—
Karczoch	●	—	15-25	k.II-p.III	7-12	20	k.V
Kawon (Arbuz)	●	—	10-20	k.II-½III	7-12	3-4	k.V-p.VI
Koper ogrodowy	—	●	600-800	III-½VIII	8-12	200-1000	—
Kukurydza	—	●	3-7	½V	7-14	400-500	—
Majeranek ogrodowy	●	●	4500-5000	II/III-½IV	7-21	2-3/10-15	½V
Marchew	—	●	500-1000	III-V, XI	14-21	60-100	—
Melon	●	—	20-30	IV	8-12	3-4	k.V-p.VI
Oberżyna	●	—	240-280	½III	10-20	5-6	k.V-p.VI
Ogórek gruntowy	—	●	30-60	½V-½VI	6-10	50-80	—
Papryka	●	—	150-200	½III-p.IV	10-20	5	k.V-p.VI
Pasternak	—	●	200-250	III-½IV	14-28	60-80	—
Pietruszka liściowa	—	●	550-600	III-IV	14-28	60-70	—
Pietruszka korzeniowa	—	●	850-950	III-IV	14-28	50-70	—
Pomidor	●	—	250-600	½III-p.IV	7-14	2-3	½V-½VI
Por	●	●	350-400	p.III/½IV	7-12	15/30-40	½IV-V
Poziomka bezrozłogowa	●	—	2000-2200	k.II-p.VII	7-28	1-2	stos. do term. siewu
Rzepa	—	●	450-700	IV, VII	5-12	30-40	—
Rzodkiew	—	●	120-150	IV, k.VI-VII	3-8	60-80	—
Rzodkiewka	—	●	100-160	III-V, VIII	3-8	150-400	—
Sałata gł. masłowa	●	●	900-1500	½II, III, p. IV-½VIII, p.IX/ p.V-½VI	6-10	4-5/8-10	stos. do term. siewu
Sałata krucha	●	●	900-1500	k.II-½VII/ p.V-½VI	6-10	3-4/6-8	stos. do term. siewu
Seler korzeniowy	●	—	1500-2000	½II-p.III	15-20	1	½V-½VI
Seler liściowy	●	—	1500-2000	½II-III	15-20	1	½V-½VI
Skorzonera	—	●	75-100	III-IV	14-21	150-200	—
Szczaw	—	●	1000-1500	IV, VIII	7-12	50	—
Szcypiorek	●	●	600-800	III/IV	5-10	5-7/30	V
Szparag	●	—	40-60	1-10.IV	8-16	15	1-20.IV
Szpinak	—	●	70-120	III-½IV -k.VIII-½IX	14-24	200-400	—

KWIATY JEDNOROCZNE

NISKIE

Aksamitka wielkokwiatowa niska
Tagetes erecta nana




III-III V VI-X 20-30

Aksamitka rozpięchła niska
Tagetes patula nana fl. pl.




V VI-X 15-35

Aksamitka pojedyncza niska typ 'Disco'
Tagetes patula nana




V VI-X 15-35

Aksamitka wąskolistna
Tagetes tenuifolia




IV V V VI-X 15-25

Aster chiński karłowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 30-35

Aster karłowy Pepite
Callistephus chinensis




III-IV V VII-X 30-35

Aster karłowy Pinokio
Callistephus chinensis




III-IV V VII-X 30-35

Aster pomponowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 60-80

Balsamina karłowa
Impatiens balsamina




III-IV V k.V VI-X 25-30

Bartonia
Bartonia aurea




IV VI-VIII 50-60

Celozja grzebieniasta
Celosia argentea cristata




IV V VII-X 20-30

Celozja pierzasta
Celosia argentea plamosa




IV V VII-X 25-40



wysiew pod osłoną

wysiew do gruntu

wyсадка

kwitnienie

wysokość rośliny

stanowisko słoneczne

stanowisko półcieniste

stanowisko zacienione

kolorystyka

Czubatka ubiorkolistna
Brachycome iberidifolia




IV VI-IX 30-35

Dalia zmienna
Dahlia pinnata Mignon




III V VII-X 35-40

Dalia zmienna
Dahlia pinnata Unwins




III V VII-X 30-70

Facelia dzwonekowata
Phacelia campanularia




IV-V VI-IX 20-30

Floks karlowy
Phlox drummondii compacta nana




III-IV V VII-X 15-30

Gazania
Gazania rigens




II-III V VI-X 30-40

Gilia główkowa
Gilia capitata




IV VIII-IX 40-60

Godecja wielkokwiatowa
Godetia grandiflora




IV-V VI-IX 30-40

Goździk chiński
Dianthus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 35-40

Kapusta ozdobna
Brassica oleracea




III-IV V-VI 20-30

Kroplik
Mimulus




III-IV V VI-IX 15-30

Laja
Layia platyglossa




IV VI-VIII 30-35

JEDNOROCZNE

NISKIE

Leptosifon
Leptosiphon hybr.




IV-V VII-VIII >15

Limnantes
Limnantes douglasii




IV-V VI-IX 15-20

Lonas
Lonas inodora




III-IV IV-V V VII-X 30-50

Lwia paszcza niska
Antirrhinum majus nan.




III-IV V VI-X 15-25

Maczek kalifornijski
Eschscholtzia calif.




IV-V VI-VIII 30-50

Mak polny
Papaver rhoeas




IV-V VII-VIII 40

Maciejka
Matthiola bicornis




IV-V VI-VIII 20-30

Marzanka
Asperula orientalis




IV-V VI-VII 20-30

Melampodium błotne
Melampodium paludosum




II-III V VI-X 30-35

Milek letni
Adonis aestivalis




IV VI-VIII 30-35

Motylek
Schizanthus wisetianensis




III IV-V VII-IX 20-40

Mrozy
Cineraria maritima




III-IV V 20-35

Nachylek niski
Careopsis tinctoria nana




III-IV V IV-V VII-IX 15-30

Nasturcja niska
Tropaeolum majus nanum




IV-V VI-X 20-30

Nemezja
Nemesia strumosa




III-IV V V VI-IX 15-25

Porcelanka
Nemophila




V VI-VIII 20

Portulaka wielokwiatowa
Portulaca grandiflora




V VII-X 10-20

Przypołudnik
Mesembryanthemum criniflorum




III-IV V VI-IX 10-20

Szałwia powabna
Salvia horminum




III-IV V VI-X 40-60

Szałwia błyszcząca
Salvia splendens




I-III V VI-X 15-30

Ubiorek
Iberis




IV-V VI-VIII 25-30

Złocien polny
Chrysanthemum segetum




IV VI-IX 50

Złotokwiat
Dimorphoteca




IV-V VI-X 25-40

Zeniszek meksykański
Ageratum houstonianum




II-III V VI-X 10-20



JEDNOROCZNE

WYSOKIE

Aksamitka wzniosła
Togetes erecta fl. pl.




III V V V-V-X 60-90

Aster bukietowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 60-70

Aster chryzantemowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 50-90

Aster igielkowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 50-80

Aster książęcy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 50-80

Aster piwoniowy
Callistephus chinensis fl. pl.




III-IV V VII-X 50-80

Chaber bławatek
Centaurea cyanus




IV-V VII-VIII 30-90

Cynia wytworna daliowa
Zinnia




III-IV V VI-X 30-90

Cynia wytworna chryzantemowa
Zinnia




III-IV V VI-X 80-90

Czarnuszka damasceńska
Nigella damascena




IV-V VII-VIII 40-50

Dzierotka
Clarkia elegans




IV-V VII-IX 60

Dziwaczek
Mirabilis jalapa




IV V VII-X 60-75

Gipsówka
Gypsophila elegans

V VI-IX 40-50

Goździk ogrodowy Chabaud
Dianthus caryophyll. Chabaud

II-III V VII-X 40-50

Lewkonia letnia
Matthiola incana annua Excelsior

III-IV V VI-VIII 50-80

Lwia paszcza wysoka
Antirrhinum majus max.

III-IV V VI-X 70-90

Łubin Hartweg
Lupinus Hartwegii

IV-V VII-X 70-80

Mak pełny
Papaver somniferum

II-IV VI-VIII 100-120

Malope
Malope

IV-V VII-X 100-120

Mietelnik
Kochia scoparia

V VI-X 80-120

Nachytek dwubarwny
Coreopsis tinctoria

III V VI-X 50-90

Nagietek
Calendula officinalis

IV-V VII-XI 30-60

Onętek
Cosmos bipinnatus

IV-V VII-X 100-120

Onętek siarkowy
Cosmos sulphureus

IV-V VI-IX 60-80



JEDNOROCZNE

WYSOKIE



Aster alpejski
Aster alpinus

IV-VII IX V-VI 25-30

Dzwonek karpacki
Campanula carpatica

V-VI IX VI-IX 25

Gęsiówka
Arabis alpina

IV-VI VIII-IX IV-VI 20-30

Goździk kropkowany
Dianthus deltoides

V-VII IX VI-VIII 15-25

Goździk pierzasty
Dianthus plumarius

IV-VI X VI-VII 20-30

Kocimiętka
Nepeta mussini

V-VI VIII-IX V-IX 30-50

Krwawnik pospolity
Achillea millefolium

V-VI VIII-IX VI-IX 40-60

Macierzanka piaszkowa
Thymus serpyllum

VI VI-IX 10-15

Mydlnica
Saponaria ocymoides

III-VI VII-IX V-VIII 10-30

Omiąg wschodni
Doronicum caucasicum

V-VII IV-VI 20-50

Pierwiosnek bezłodygowy
Primula acaulis

I-III IV-V III-V 10-15

Pierwiosnek ząbkowany
Primula denticulata

IV-VI VIII-IX III-IV 20-30

Pierwiosnek wzniosły
Primula elatior




V-VI VIII-X III-V 20-30

Postonek
Helianthemum mutabile




III-V IX V-VII 10-30

Przymiotno
Erigeron speciosus




IV V-VI IX VI-VIII 40-80

Rogownica
Cerastium biebersteinii




IV-VI IX VII-VIII 25

Rozwar wielokwiatowy
Platycodon grandiflorum




V-VI IX VI-VIII 30-60

Sasanka
Anemone pulsatilla




III-V VII-IX III-IV 15-25

Skalnica
Saxifraga arendsii




IV-VI IX V-VI 15-20

Smagliczka skalna
Alyssum saxatile




IV-VII IX IV-VI 15-25

Smółka pospolita
Lychnis viscaria




V-VI VIII-IX VI-VII 40-50

Stokrotka łąkowa
Bellis perennis




III-IV, VII IX IV-XI 10-15

Szarotka alpejska
Leontopodium alpinum




II-III V-VI VI-VIII 15

Ubiorek wiecznie zielony
Iberis sempervirens




IV-VI IX IV-VI 25-30

NISKIE

BYLINY

Wiesiołek missouryjski
Oenothera missouriensis




III V VI-IX 20-30

Zawciąg
Armeria maritima




V-VIII IX IV-VI 15-20

Żagwin
Aubrieta cultorum




IV VIII-IX V-VI 10-15



WYSOKIE

Aster gawędka
Aster amellus




IV-V VII-IX VIII-X 40-50

Chaber wielkokwiatowy
Centaurea macrocephala




IV-VI IX VII-VIII 80-100

Driakiew kaukaska
Scabiosa caucasica




V-VI IX VII-IX 50-70

Dzielżan
Helenium hoopesii




IV-VI VII-IX V-VIII 50-80



WYSOKIE

Dzwonek skupiony
Campanula glomerata




V-VI IX VI-VIII 50-60

Dzwonek brzoskwiolistny
Campanula persicifolia




V-VI IX VI-VIII 50-80

Firletka chalcidońska
Lychnis chalcidonica




V-VI VII-IX VI-VIII 70-100

Gailardia - Działwa
Gaillardia aristata




V-VI IX VI-IX 40-80

Karczoch hiszpański
Cynara cardunculus




II-III V VIII-IX 160

Kuklik chilijski
Geum chilense




III-IV VIII-IX VI-VIII 40-60

Kupidynek
Catananche coerulea




III-IV VII-VIII VII-IX 40-60

Len trwały
Linum perenne




IV-V VIII-IX 60-100

Lepnica
Sedum orientalis




IV-V IX VI-IX 60-70

Łubin trwały
Lupinus polyph. Russel




IV-V VI-VIII 100-120

Łyszczec wiechowaty
Gypsophila paniculata




III-V IX VI-VIII 40-120

Nachylek wielokwiatowy
Coreopsis grandiflora




IV-VI VII-IX VII-IX 30-90

Nawłoc kanadyjska
Solidago canadensis




IV-V VII-VIII VIII-X 80-120

Odełka wirginijska
Physostegia virginiana




V-VI VIII-IX VIII-IX 60-100

Orlik
Aquilegia coerulea
McKana's




V IX VI-VII 60-100

Ostróżka trwała
Delphinium cultorum




IV-VI IX VI-VIII 150-200

Przetacznik kłosowy
Veronica spicata




V-VI VII-IX VI-IX 40-60

Przymiotno
Erigeron speciosus




IV V-VI IX VI-VIII 40-80

Rudbekia purpurowa
Rudbeckia purpurea




V-VI IX VII-VII (2) 90-100

Słoneczniczek
Heliopsis scabra




V-VII IX VII-IX 100-120

Trojeść
Asclepias tuberosa




IV-VII VII-X VII-IX 70

Trytoma
Rhizophia




V-VI VII-VIII VII-IX 80-130

Złocien różowy
Chrysanthemum coccineum




V-VI IX VI-VIII 80-90

Złocien właściwy
Chrysanthemum leucanthemum




V-VI IX VI-VIII 30-120

ROŚLINY

BALKONOWE I PNAĆE





ROŚLINY

BALKONOWE I PNAĆE



KWIATY DWULETNI

Bratek wielkokwiatowy
Viola wittrockiana

VI-VIII IX V-X 15-25

Bratek Rokoko
Viola wittrockiana Rococo

VI-VIII IX V-VII 15-20

Dzwonek ogrodowy
Campanula medium

V-VI IX VI-VIII 40-90

Fiolek rogaty
Viola cornuta

V-VII IX V-X 15-20

Goździk ogrodowy
Dianthus caryophyllus fl. pl.

V VIII VI-VIII 40-60

Goździk brodaty
Dianthus barbatus

V-VI VIII-IX VI-VIII 30-60

Mak syberyjski
Papaver nudicaule

VI-IX VIII-IX (1. rok) V-VI (2. rok) 25-30

Malwa
Althaea rosea fl. pl. Chaters

V-VI IX VII-VIII 200-250

Naparstnica purpurowa
Digitalis purpurea

V-VI (1. rok) IX (2. rok) VI-VIII (2. rok) 80-150

Niezapominajka
Myosotis sylvatica

VI-VII IX V-VI 15-25

Stokrotka wielkokwiatowa
Bellis perennis fl. pl.

VI-VII IX V-X 12-25

Stokrotka pomponowa
Bellis perennis Pomponette

VI-VII IX V-X 12-25



Czarnuszka orientalna
Nigella orientale




IV-V VII-VIII 40-50

Driakiew gwiazdzista
Scabiosa stellata




IV VII-IX 40-60

Dziewięcił bezłodygowy
Carlina acaulis




V-VI IX VII-IX (2 rok) 10-15

Dzwony irlandzkie
Molucella leavis




III-IV V VII-IX 60-100

Kocanka
Helichrysum bracteatum monstr.




V VII-X 30-100

Kraspedia
Craspedia globosa




II-III V VII-IX 60-70

Krwawnik
Achillea filipendulina




V-VI (1 rok) IX (1 rok) VII-X (2 rok) 100-120

Kukurydza ozdobna
Zea japonica




V 150-200

Liatry kłosowa
Liatris spicata




II-III IV-VI IX VI-VIII (2 rok) 50-80

Miechunka
Physalis alkekengi




V-VI IX VIII-IX 50-70

Miejszcznica
Lunaria annua




V-VI V-VII 80-100

Mikołajek
Eryngium plenum




II-IV IX VI-VIII 60-80

NA SUCHE BUKIETY

KWIATY

Przegorzan kulisty
Echinops ritro




V-VI IX VI-VIII 150

Sucholuska
Helipterum roseum




V VI-IX 20-60

Szarłat ogrodowy
Amaranthus caudatus




IV V VII-X 40-100

Szczęć
Dipsacus sativus




V-VI IX VI-VII 80-100



Trawa pampasowa
Cortaderia selloana




III-IV V IX-X 100-200

Wiecznik
Gomphrena globosa




III-IV V VI-X 20-30

Zatrwan tatarski
Limonium tataricum




IV-V VII-IX VI-IX 35-50

Zatrwan wrębny
Limonium sinuatum




III-IV V VIII-X 40-50



KWIAŁY



MIESZANKI



ROŚLINY PNĄCE



KWIAŁY LETNIE



BYLINY

TRAWY OZDOBNE





Biohumus uniwersalny

Biohumus pelargonie

Biohumus rośliny kwitnące

Przeznaczone do zasilania:

- roślin ozdobnych na balkonach i w ogrodach,
- upraw warzyw i owoców,
- roślin domowych.

- ✓ naturalny
- ✓ wydajny
- ✓ praktyczny w stosowaniu
- ✓ nie istnieje ryzyko przენawożenia
- ✓ uaktywniający składniki pokarmowe gleby




NAWOZY

Nawóz długodziałający

przeznaczony do uprawy i pielęgnacji:


- roślin doniczkowych • balkonowych • uprawianych w pojemnikach • drzew i krzewów ozdobnych i owocowych
- bylin • róż • truskawek i poziomek • warzyw • trawnika.

- ✓ kompleksowy
- ✓ otoczkowany
- ✓ granulowany
- ✓ długodziałający - (120 dni)



Nawóz uniwersalny

Uniwersalny, kompleksowy, mineralny nawóz przeznaczony do dogłębowego dokarmiania roślin. Zapobiega i usuwa niedobory składników pokarmowych. Niezastąpiony do nawożenia warzyw w gruncie i pod osłonami, roślin jagodowych, strączkowych, krzewów owocowych, trawników oraz kwiatów ogrodowych.



Trawa uniwersalna

Mieszanka do wszechstronnego użytkowania, składająca się z podstawowych gatunków traw. Charakteryzuje się szybkimi wschodami oraz dobrym zadarnieniem dzięki zastosowaniu wiechliny łąkowej. Z mieszanki uzyskamy ładny, szybko rozwijający się trawnik.



Trawa dywanowa

Starannie skomponowana mieszanka o wspaniałych walorach dekoracyjnych dla osób chcących uzyskać efekt dywanu. Charakteryzuje się wolnym przyrostem, wyjątkowo równą darnią i dużą odpornością na przemarzanie. Trawnik wymaga jednak starannej pielęgnacji. Idealna do terenów o mniej intensywnym użytkowaniu, ozdobnych trawników i zieleńców, jako tło dla rabat kwiatowych i żywopłotów. Zaleca się wysiew na glebach żyznych.



Trawa sportowa

Mieszanka przeznaczona na boiska i tereny sportowe lub trawniki intensywnie użytkowane, np. place zabaw czy tereny campingowe. Duża zawartość wiechliny łąkowej (15%) powoduje powstanie gęstej i wytrzymałej darni. Z kolei, życica trwała wpływa na szybką regenerację murawy. Starannie dobrane odmiany sprawiają, że mieszanka doskonale sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych. Mieszanka odporna na wymarzenie. Zaleca się wysiew na glebach żyznych.

PRODUKTY MARKI TORSEED S.A.

RÓŻE



wielkokwiatowe



pnące



rabatowe



parkowe



CENTRA OGRODNICZE i HURTOWNIE FIRMOWE



TORUŃ

Centrum Ogrodnicze

ul. Rydygiera 50, 87-100 Toruń

centrum-rydygiera@torseed.pl

Kierownik Centrum tel. 509 669 349

Sklep tel. 56 659 94 00

Kierownik Sklepu tel. 504 239 564

Dział Szkółkarski tel. 56 648 03 55

Kierownik Działu

Szkółkarskiego tel. 504 239 622

Hurtownia Ogrodnicza

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

hurtowniatorun@torseed.pl

tel. 56 658 48 30

fax 56 658 48 38

Przedstawiciele handlowi

tel. 502 379 641

tel. 509 669 340

KOSZALIN

Centrum Ogrodnicze

i Hurtownia Ogrodnicza

Biesiekierz k. Koszalina,

76-039 Biesiekierz

centrum-kotlowo@torseed.pl

Kierownik Centrum tel. 508 272 780

Sklep tel. 94 318 00 22

Kierownik Sklepu tel. 504 239 602

Kierownik Działu

Szkółkarskiego tel. 504 239 595

Hurtownia tel. 94 318 00 35

Kierownik Hurtowni tel. 504 239 566

LUBLIN

Centrum Ogrodnicze

i Hurtownia Ogrodnicza

ul. Graniczna 2, Wierzchowiska II,

21-050 Piaski

centrum-wierzchowiska@torseed.pl

Kierownik Centrum tel. 510 035 206

Sklep tel. 81 581 09 70

Kierownik Sklepu tel. 504 239 605

Hurtownia tel. 81 581 09 73

fax 81 581 02 94

Kierownik Hurtowni tel. 504 239 603

Przedstawiciel

handlowy tel. 500 378 080





TORSEED
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 35,
87-100 Toruń
www.torseed.pl
torseed@torseed.pl

